



Marketing authorisation holder: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, France
GB: Ceva Animal Health Ltd, Explorer House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0HH, UK

Manufacturer responsible for batch release:
 Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, France
 AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, France

NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

Vectra® Felis 423 mg/42.3 mg spot-on solution for cats
 dinotefuran/pyriproxyfen

STATEMENT OF THE ACTIVE SUBSTANCES AND OTHER INGREDIENTS

Each 0.9 ml spot-on applicator delivers: 423 mg dinotefuran and 42.3 mg pyriproxyfen.

Colourless to pale yellow spot-on solution.

INDICATION(S)

This veterinary medicine kills fleas (*Ctenocephalides felis*) on infested cats and prevents further infestations for one month. It also prevents the multiplication of fleas, by inhibiting immature flea emergence in the cat's environment, for 3 months.

CONTRAINDICATIONS

Do not use in cats or kittens weighing less than 0.6 kg. Do not use in case of hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.

ADVERSE REACTIONS

Slight scales, transient erythema and alopecia can be observed in rare cases, which usually disappear spontaneously without treatment. Transient neurological signs such as muscle tremors or lethargy may occur very rarely and in particular after application site licking. Transient cosmetic effects such as wet hair and a white dry residue may occur at the application site very rarely and may persist up to 7 days; however, these effects are usually not noticeable after 48 hours. These changes do not affect the safety or the efficacy of the veterinary medicinal product. Other application site disorders such as erythema, pruritus, lesions and inflammation may occur very rarely. Hyperactivity, and tachypnoea may occur very rarely. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention:

- very common (more than 1 in 10 animals treated displaying adverse reaction(s))
- common (more than 1 but less than 10 animals in 100 animals treated)
- uncommon (more than 1 but less than 10 animals in 1,000 animals treated)
- rare (more than 1 but less than 10 animals in 10,000 animals treated)
- very rare (less than 1 animal in 10,000 animals treated, including isolated reports).

If you notice any side effects, even those not already listed in this package leaflet or you think that the medicine has not worked, please inform your veterinary surgeon.

TARGET SPECIES: Cats.

DOSE: Spot-on use. Use one spot-on applicator for one administration on one cat only.

The use in cats younger than 7 weeks or weighing less than 0.6 kg is not recommended. (The minimum recommended dose is 42.3 mg dinotefuran/kg bodyweight and 4.23 mg pyriproxyfen/kg bodyweight. The treatment dose range is 42.3 to 705 mg dinotefuran/kg bodyweight and 4.23 to 70.5 mg pyriproxyfen/kg bodyweight for cats which weigh between 0.6 kg and 10 kg).

Treatment schedule: Following a single administration, the veterinary medicinal product will prevent flea infestation for one month and further flea multiplication by inhibiting flea emergence in the environment of the cat for 3 months. The need to re-treat cats which are likely to be re-infested, and the time interval between such treatments, should be based on an assessment by the responsible veterinarian.

ADMINISTRATION

Care should be taken to apply the veterinary medicine only onto intact (undamaged) cats skin.


How to apply: Remove the spot-on applicator from the pack.



Step 1: Hold the applicator upright, placing fingers below the larger disk as shown.



Step 2: With the other hand, press downwards on the smaller disk until the 2 disks meet evenly. This will pierce the seal.



Step 3: The cat should be standing or in a comfortable position for easy application. At the base of cat's head, part the hair until the skin is visible. Apply the veterinary medicinal product slowly with the tip of the applicator on the skin. Avoid superficial application to the cat's hair.

SPECIAL STORAGE PRECAUTIONS

Keep out of the sight and reach of children.

This veterinary medicinal product does not require any special storage conditions.

Do not use this veterinary medicinal product after the expiry date which is stated on the carton and spot-on applicator after "EXP".

The expiry date refers to the last day of that month.

SPECIAL WARNINGS

Special warnings for each target species: All cats within the household should be treated. Dogs in the household should only be treated with a veterinary medicinal product authorised for use in that species. Fleas can infest the cat's basket, bedding and regular resting areas such as carpets and soft furnishings. In case of massive flea infestation and at the beginning of the control measures, these areas should be treated with a suitable insecticide and then vacuumed regularly. The impact of shampooing on the efficacy of the veterinary medicinal product has not been evaluated. In case of suspicion of dermatitis (itch and skin irritation), seek for veterinary advice.

Special precautions for use in animals: For external use only. Apply only to the skin surface. Do not administer orally or via any other route. The safety of this veterinary medicine has not been established in cat younger than 7 weeks of age or weighing less than 0.6 kg (see section "Contraindications"). After accidental ingestion of the product, transient reactions such as salivation, abnormal faeces and emesis may occur; however these should resolve without treatment within 4 hours. Care should be taken to apply the dose to an area where the animal cannot lick it off (as described in section "Advice on correct administration"), and to ensure that animals do not groom each other immediately following treatment. Care should be taken to ensure that the contents of the spot-on applicator, or the applied dose, do not come into contact with the eyes of the cat being treated and/or any other animals. No studies have been performed in sick or convalescent cats, therefore use in these cats should be based on the benefit-risk assessment of a veterinarian.

Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals: Wash hands thoroughly and immediately after use. The veterinary medicinal product is irritating to the eyes and skin. To avoid adverse reactions:

- Wash hands thoroughly and immediately after use.
- Avoid contact with the skin, eyes or mouth.
- In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.
- If the veterinary medicinal product accidentally gets into the eyes, they should be rinsed with water immediately, with the eyelids open, and for a sufficient length of time.
- Treated animals must not be handled for at least eight hours after application of the product. It is therefore recommended to treat the animal in the evening.
- Treated animals should not be allowed to sleep with their owners, especially children, on the day of treatment.
- Used applicators should be disposed of immediately and not left within the sight or reach of children.

If skin or if eye irritation persists, or in case of accidental ingestion, seek medical advice immediately and show the package leaflet or the label to the physician.

Pregnancy and lactation: The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and lactation in adult female cats. Use only accordingly to the benefit/risk assessment by the responsible veterinarian. Laboratory studies with the active substances, dinotefuran and pyriproxyfen, in rats and rabbits have not produced any evidence of birth defects or other harmful effects in the developing embryo or foetus (teratogenic, foetotoxic) or harmful effects for the mother (maternotoxic effects). In rats, dinotefuran has been shown to cross the blood-milk barrier and is excreted in the milk.

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: None known.

Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes): No important adverse reactions were observed in healthy kittens aged 7 weeks or more, topically treated 7 times at 2 week intervals and with up to 4 times the highest recommended dose except transient oedema or dry skin at the application site.

Incompatibilities: None known.

DISPOSAL

Vectra® Felis should not enter water courses as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with the veterinary medicinal product or with used containers.

Vectra® Felis should not be disposed of via wastewater or household waste. Unused product or waste material derived from the product should be disposed of following local regulation. These measures should help to protect the environment.

OTHER INFORMATION

GB: [NFA-VPS] Vm 15052/5025

Pack sizes: Cardboard box of 1, 3, 4, 6, 12 or 24 or spot-on applicator(s). Not all pack sizes may be marketed.

Mechanisms of action: The two active ingredients in the product spread over the body surface of the cat within the first day after application. The actives act directly on the cat's coat without any need to infiltrate the blood flow. The parasite comes in contact with the treated cat and is then killed. Dinotefuran kills insects by targeting their nervous system. Pyriproxyfen targets the immature stages of insects (eggs, larvae, pupae) by disruption of their reproduction and development. Flea eggs and, larvae and pupae are present in the environment.

The veterinary medicinal product kills fleas within 2 hours after application of the product or 2 hours after infestation of the treated animal.

Detailed information on this veterinary medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency (<http://www.ema.europa.eu/>).



Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia
 AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Francia

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Vectra® Felis 423 mg/42,3 mg soluzione spot-on per gatti dinotefuran/piriproxifene

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni applicatore per spot-on da 0,9 ml dispensa: 423 mg dinotefuran e 42,3 mg piriproxifene.

Soluzione spot-on da incolore a giallo chiara.

INDICAZIONI

Questo medicinale veterinario uccide pulci (*Ctenocephalides felis*) in gatti infestati e previene ulteriori infestazioni per un mese. Previene anche la moltiplicazione di pulci inibendo la comparsa di pulci immature nell'ambiente del gatto per 3 mesi.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in gatti o gattini che pesano meno di 0,6 kg. Non usare in casi di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE

In rari casi, possono essere osservati leggera forfora, eritema transitorio e alopecia che di solito scompaiono spontaneamente senza trattamento. Segni neurologici temporanei come tremore muscolare o letargia potrebbero verificarsi molto raramente ed in particolare dopo leccamento del sito di applicazione.

Sono stati riportati effetti estetici transitori come aspetto untuoso del pelo ed accumuli al sito di applicazione molto raramente e possono persistere fino a 7 giorni; tuttavia, questi effetti non sono di solito più visibili dopo 48 ore. Questi cambiamenti non coinvolgono la sicurezza o l'efficacia del medicinale veterinario.

Si possono verificare molto raramente altri disturbi al sito di applicazione come eritema, prurito, lesioni e infiammazione.

Iperattività e tachipnea si possono verificare molto raramente. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse nel corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Gatti.

DOSSAGGIO: Spot-on. Usare un applicatore spot-on per una somministrazione su un solo gatto. Non è raccomandato l'uso in gatti più giovani di 7 settimane o che pesano meno di 0,6 kg. (La dose minima raccomandata è 42,3 mg di dinotefuran/kg peso corporeo e 4,23 mg di piriproxifene/kg peso corporeo. L'intervallo di dosaggio di trattamento è da 42,3 a 705 mg di dinotefuran/kg peso corporeo e da 4,23 a 70,5 mg di piriproxifene/kg peso corporeo per gatti che pesano tra 0,6 kg e 10 kg).

Schema di trattamento: A seguito di singola applicazione, il medicinale veterinario preverrà l'infestazione da pulci per un mese e previene anche la moltiplicazione di pulci inibendo la comparsa di pulci nell'ambiente del gatto per 3 mesi. La necessità di ritrattare i gatti con probabilità di essere re-infestati e l'intervallo di tempo tra tali trattamenti deve essere effettuato in base alla valutazione del veterinario.


APPLICAZIONE

Prestare attenzione ad applicare il medicinale veterinario solo su cute intatta (non lesa) del gatto.

Come applicare: Rimuovere l'applicatore per spot-on dalla confezione.



Fase 1: Mantenere l'applicatore in posizione verticale, posizionando le dita sotto al disco più grande come indicato.



Fase 2: Con l'altra mano, premere sul disco più piccolo verso il basso finché i 2 dischi non combaciano uniformemente. In questo modo si forerà il sigillo dell'applicatore.



Fase 3: Il gatto deve stare in piedi o in posizione comoda per una facile applicazione. Separare il pelo per rendere visibile la cute alla base della testa del gatto. Applicare il medicinale veterinario lentamente con l'estremità arrotondata dell'applicatore sulla cute. Evitare l'applicazione superficiale sul pelo del gatto.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dell'applicatore spot-on dopo "EXP". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

AVVERTENZE (E) SPECIALE (I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Devono essere trattati tutti i gatti della casa. I cani della casa devono essere trattati solo con un medicinale veterinario autorizzato per l'uso in quella specie. Le pulci possono infestare la cesta, la cuccia e le consuete aree di riposo del gatto come tappeti e divani e poltrone. In caso di infestazione imponente da pulci ed all'inizio di misura di controllo, queste aree dovrebbero essere trattate con un insetticida appropriato e poi pulite con l'aspirapolvere regolarmente. Non è stato valutato l'impatto dello shampoo sull'efficacia del medicinale veterinario. In caso di sospetta dermatite (prurito e irritazione cutanea), consultare il medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Solo per uso esterno. Applicare solo sulla superficie delle cute. Non somministrare per via orale o per qualsiasi altra via. La sicurezza di questo medicinale veterinario non è stata provata in gatti di età inferiore a 7 settimane o che pesano meno di 0,6 kg (vedere paragrafo "Controindicazioni"). In caso di ingestione accidentale del prodotto, potrebbero comparire reazioni avverse transitorie come salivazione, feci abnormi ed emesi, che dovrebbero tuttavia scomparire senza trattamento entro 4 ore. Deve essere prestata attenzione ad applicare la dose dove l'animale non possa leccarlo via (come descritto al paragrafo "Avvertenze per una corretta somministrazione"), ed assicurare che gli animali non si leccino l'un l'altro immediatamente dopo il trattamento. Deve essere prestata attenzione ad evitare che il contenuto dell'applicatore spot-on, o della dose applicata, non entri in contatto con gli occhi del gatto da trattare e/o di qualsiasi altro animale. Non sono stati effettuati studi su gatti malati o convalescenti, pertanto l'uso in tali gatti deve basarsi sulla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Il medicinale veterinario è irritante per gli occhi e la cute. Al fine di evitare reazioni avverse:

- Lavare le mani accuratamente ed immediatamente dopo l'uso.
- Evitare il contatto con la cute, gli occhi o la bocca.
- In caso di fuoriuscita accidentale sulla cute, lavare immediatamente con sapone ed acqua.
- Se il medicinale veterinario entra a contatto accidentalmente con gli occhi, quest'ultimi devono essere sciacquati immediatamente con acqua, con le palpebre aperte e per un adeguato periodo di tempo.
- Gli animali trattati non devono essere toccati per almeno otto ore dopo l'applicazione del medicinale veterinario. Si consiglia pertanto di trattare l'animale la sera.
- Il giorno del trattamento, non si dovrebbe permettere agli animali trattati di dormire con i proprietari, soprattutto se bambini.
- Gli applicatori usati devono essere smaltiti immediatamente e non essere lasciati in vista ed alla portata di bambini.

Se l'irritazione alla cute o agli occhi persiste, o se il medicinale veterinario è ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento: La sicurezza del medicinale veterinario in grante adulte non è stata stabilita durante la gravidanza e l'allattamento. Usare solo in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile. Studi di laboratorio con i principi attivi, dinotefuran o piriproxifene, in ratti e conigli non hanno evidenziato difetti alla nascita o altri effetti nocivi nello sviluppo embrionale o fetale (teratogeni, fetotossici) o effetti nocivi per la madre (effetti maternotossici). È stato provato che nei ratti il dinotefuran attraversa la barriera sangue-latte ed è escreto nel latte.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: Nessuna nota.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Fatta eccezione per eritema e secchezza cutanea transitoria al sito di applicazione, non sono state osservate reazioni avverse clinicamente rilevanti in gattini sani dell'età di 7 settimane o più, trattati per via topica 7 volte ad intervalli di 10 giorni e fino a 4 volte il dosaggio raccomandato.

Incompatibilità: Non note.

SMALTIMENTO

Vectra® Felis non deve entrare in acqua d'acqua poiché ciò potrebbe essere pericoloso per i pesci ed altri organismi acquatici.

Non contaminare stagni, corsi d'acqua o fossati con il medicinale veterinario o i contenitori usati.

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti alle disposizioni di legge locali. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni: Scatola di cartone da 1, 3, 4, 6, 12 o 24 applicatore(i) per spot-on. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Mechanismi d'azione: I due principi attivi del medicinale veterinario si diffondono sulla superficie corporea del gatto entro il primo giorno dopo l'applicazione. I principi attivi agiscono direttamente sul mantello del gatto senza doversi innestare nel torreno. I parassiti entrano in contatto con il gatto trattato e poi sono uccisi. Il dinotefuran uccide gli insetti agendo sul loro sistema nervoso. Il piriproxifene agisce sugli stadi immaturi degli insetti (uova, larve, pupe) tramite l'interruzione della loro riproduzione e sviluppo. Le uova delle pulci, larve e pupe sono presenti nell'ambiente. Il medicinale veterinario uccide le pulci entro 2 ore dall'applicazione del prodotto o 2 ore dopo l'infestazione dell'animale trattato.

Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito Web dell'Agenzia Europea per i Farmaci (<http://www.ema.europa.eu/>).

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Ceva Sante Animale, 10 av. de La Ballastiere, 33500 Libourne, Γαλλία
Παραγωγός υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:
Ceva Sante Animale, 10 av. de La Ballastiere, 33500 Libourne, Γαλλία
AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Γαλλία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vectra® Felis 423 mg/42,3 mg διάλυμα για επίχυση σε γάτες
dinotefuran/pyriproxyfen

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε συσκευή επίχυσης σε σημείο των 0,9 ml χορηγεί: 423 mg dinotefuran και 42,3 mg pyriproxyfen.

Αχρωμο έως αχροκίτρινο διάλυμα επίχυσης σε σημείο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αυτό το κτηνιατρικό φάρμακο θανατώνει τους ψύλλους (*Ctenocephalides felis*) των γατών που παρασιτούνται και προλαμβάνει περαιτέρω προσβολή τους για ένα μήνα. Επίσης, εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των ψύλλων για 3 μήνες, αναστέλλοντας την επώαση των αυγών των ψύλλων στο περιβάλλον της γάτας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες ή γατάκια σωματικού βάρους μικρότερου του 0,6 kg. Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν ελαφρά αποφολιδώση, περιοδικό ερύθημα και αλωπεκία, που συνήθως παύονται αυτόματα χωρίς θεραπεία. Πολύ σπάνια, και ιδιαίτερα μετά από λήξη του σημείου εφαρμογής και προϊόντος, μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά νευρολογικά συμπτώματα, όπως μίκιός τρόμος ή λήθαργος. Παροδικές αισθητικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υγρό τρίχωμα και ένα λευκό ξηρό υπόλειμμα, δυνατό να παρατηρηθούν πολύ σπάνια στο σημείο εφαρμογής και μπορεί να επιμείνουν έως και 7 ημέρες. Όμως, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθως αντιληπτές μετά 48 ώρες και δεν επηρεάζουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες στο σημείο εφαρμογής, όπως ερύθημα, κνησμός, αλλοιώσεις και φλεγμονή μπορεί να παρατηρηθούν πολύ σπάνια. Υπερδραστικότητα και ταχυτίνοια μπορεί να παρατηρηθούν πολύ σπάνια.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνιάτρο σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Επίχυση σε σημείο. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φάρμακο μόνο σε άθικτο (υγιές) δέρμα γάτας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιήστε μια συσκευή επίχυσης σε σημείο για μια χορήγηση σε μια γάτα μόνο. Δε συνιστάται η χρήση σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 7 εβδομάδων ή σωματικού βάρους μικρότερου του 0,6 kg. (Η ελάχιστη συνιστώμενη δόση είναι 42,3 mg dinotefuran/kg σωματικού βάρους και 4,23 mg pyriproxyfen/kg σωματικού βάρους. Η θεραπευτική δοσολογία είναι 42,3 έως 705 mg dinotefuran/kg σωματικού βάρους και 4,23 έως 70,5 mg pyriproxyfen/kg σωματικού βάρους για γάτες με σωματικό βάρος 0,6 έως 10 kg).

Θεραπευτικό σχήμα: Μία εφάπαξ χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος έχει ως αποτέλεσμα την πρόληψη της προσβολής από ψύλλους για ένα μήνα. Και εμποδίζει τον επιπλέον πολλαπλασιασμό των ψύλλων αναστέλλοντας την επώαση των αυγών των ψύλλων στο περιβάλλον της γάτας για 3 μήνες. Η ανάγκη επανάληψης της θεραπείας σε γάτες που είναι πιθανό να προσβληθούν πάλι και το διάστημα μεταξύ των θεραπειών πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του υπεύθυνου κτηνιάτρο.

Τρόπος εφαρμογής: Αφαιρέστε τη συσκευή επίχυσης σε σημείο από τη συσκευασία.

Βήμα 1:

Κρατήστε τη συσκευή όρθια, τοποθετώντας τα δάκτυλα κάτω από τον μεγαλύτερο δακτύλιο όπως στο σχήμα.



Βήμα 2:

Με το άλλο χέρι, πιέστε προς τα κάτω τον μικρότερο δακτύλιο μέχρι οι 2 δακτύλιοι ακουμπήσουν μεταξύ τους ομαλά. Αυτό θα τρυπήσει την ασφάλεια.



Βήμα 3:

Η γάτα πρέπει να είναι όρθια ή σε μια άνετη θέση για εύκολη χορήγηση. Παραμερίστε το τρίχωμα στη βάση της κεφαλής μέχρι να φανεί το δέρμα. Εφαρμόστε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αργά με το άκρο της συσκευής επάνω στο δέρμα. Αποφύγετε την επιφανειακή εφαρμογή επάνω στο τρίχωμα της γάτας.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.

Να μη χρησιμοποιείται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και τη συσκευή επίχυσης σε σημείο, μετά "EXP": Η ημερομηνία λήξης συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Πρέπει να χορηγείται θεραπεία σε όλες τις γάτες ενός νοικοκυριού. Οι σκύλοι του νοικοκυριού πρέπει να θεραπεύονται μόνο με ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν εγκεκριμένο για χρήση σε αυτό το είδος ζώου. Οι ψύλλοι μπορεί να μολύνουν το καλάθι της γάτας, την κλινισορωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσης, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα. Σε περίπτωση μαζικής προσβολής από ψύλλους και στην αρχή της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και στη συνέχεια να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα. Η επίδραση του λουσίματος στην αποτελεσματικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει διερευνηθεί. Σε περίπτωση υποψίας δερματίτιδας (κνησμός και ερεθισμός του δέρματος), συμβουλευθείτε κτηνίατρο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Εφαρμόστε στην επιφάνεια του δέρματος. Μην το χορηγήσετε από το στόμα ή από άλλη οδό χορήγησης. Η ασφάλεια αυτού του κτηνιατρικού φαρμάκου δεν έχει αποδειχθεί σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 7 εβδομάδων ή σωματικού βάρους μικρότερου του 0,6 kg (βλ. παράγραφο „Αντενδείξεις“). Μετά από τυχαία κατάποση του προϊόντος, μπορεί να παρατηρηθούν παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως σιελόρροια, μη κανονικά κόπρανα και έμετος, που, όμως, παρέχονται σε 4 ώρες χωρίς θεραπεία. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η δόση να εφαρμόζεται σε μια περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να την αφαιρέσει λείχοντας (βλ. παράγραφο «Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση») και να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν λείχουν το ένα το άλλο αμέσως μετά τη θεραπεία. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το περιεχόμενο της συσκευής επίχυσης σε σημείο, ή η χορηγούμενη δόση, να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια της υπό θεραπεία γάτας και/ή οποιοδήποτε άλλο ζώου. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε άρρωστες ή σε ανάρρωσες γάτες, ως εκ τούτου η χρήση σε αυτές τις γάτες πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση από τον κτηνίατρο της σχέσης οφέλους-κινδύνου.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Ατομα με γνωστή υπερευαισθησία στις dinotefuran, pyriproxyfen ή το dimethyl sulfoxide πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών:

- Πλύνετε τα χέρια επιμελώς και αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα.
- Σε περίπτωση τυχαίας διαβροχής του δέρματος, ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν τυχαία εισέλθει στα μάτια, πρέπει αμέσως και για ικανό χρονικό διάστημα να τα ξεπλύνετε με νερό, με τα βλέφαρα ανοιχτά.
- Να μη γίνεται χειρισμός των ζώων που έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστον οκτώ ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Γι' αυτό, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος στο ζώο το απόγευμα.
- Την ημέρα της θεραπείας, δεν πρέπει να επιτρέπεται στα ζώα που έλαβαν τη θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

• Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται αμέσως και να μην αφήνονται σε μέρος που βλέπουν ή προσεγγίζουν παιδιά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος ή των ματιών επιμένει, ή σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.

Κύηση και γαλουχία: Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε ενήλικες θηλυκές γάτες κατά την κύηση και γαλουχία. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Εργαστηριακές μελέτες με τα δραστικά συστατικά, dinotefuran ή pyriproxyfen, σε επίμψεις και κουνέλια δεν έδειξαν ανωμαλίες στη γέννηση ή άλλες επιβλαβείς δράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου και στο έμβρυο (τερατογόνος, εμβρυοτοξική δράση) ή επιβλαβείς δράσεις στη μητέρα (μητρική τοξική δράση). Η dinotefuran έχει αποδειχθεί σε επίμψεις ότι διαπερνά το φραγμό αίματος-γάλακτος και εκκρίνεται στο γάλα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Καμία γνωστή.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντιδότα): Εκτός από παροδικό οίδημα ή ξηρό δέρμα στο σημείο εφαρμογής, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε υγιείς γάτες ηλικίας 7 εβδομάδων ή περισσότερο, που έλαβαν 7 φορές θεραπεία τοπικά με μεσοδιστήματα 2 εβδομάδων και με δόση 4πλάσια της μεγαλύτερης συνιστώμενης δόσης.

Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Το Vectra® Felis δεν πρέπει να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδροβίους οργανισμούς. Μην μολύνετε λίμνες, υδατοαγωγούς ή τάφρους με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των αστικών λυμάτων ή των οικιακών απορριμμάτων.

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία

Χάρτινο κουτί 1, 3, 4, 6, 12 ή 24 συσκευών επίχυσης σε σημείο. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Μηχανισμός δράσης

Τα δύο δραστικά συστατικά του προϊόντος κατανέμονται στην επιφάνεια του σώματος της γάτας την πρώτη ημέρα μετά την εφαρμογή. Τα δραστικά συστατικά δρουν απευθείας στο τρίχωμα της γάτας, χωρίς ανάγκη διείσδυσης στην κυκλοφορία του αίματος. Το παρσίτο έρχεται σε επαφή με την υπό θεραπεία γάτα και θανατώνεται. Η dinotefuran σκοτώνει τα έντομα στοχεύοντας στο νευρικό τους σύστημα. Η pyriproxyfen στοχεύει στα άωρα στάδια των εντόμων (αυγά, προνύμφες, νύμφες) αναστέλλοντας την αναπαραγωγή και ανάπτυξη τους. Αυγά ψύλλων, προνύμφες και νύμφες βρίσκονται στο περιβάλλον.

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θανατώνει τους ψύλλους εντός 2 ωρών από την εφαρμογή του ή 2 ώρες μετά την προσβολή του ζώου στο οποίο χορηγήθηκε θεραπεία.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (<http://www.ema.europa.eu/>).

Podmiot odpowiedzialny:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francja
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francja
AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Francja

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vectra® Felis 423 mg/42,3 mg roztwór do nakrapiania dla kotów
dinotefuran/pyriproksyfen

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy 0,9 ml aplikator do nakrapiania zawiera: dinotefuran 423 mg, pyriproksyfen 42,3 mg.

Bezbarwny do jasnożółtego roztwór do nakrapiania.

WSKAZANIA LECZNICZE

Ten lek weterynaryjny zabija pchły (*Ctenocephalides felis*) na zakażonych kotach i zapobiega dalszej inwazji przez jeden miesiąc. Produkt zapobiega także namnażaniu pcheł, dzięki blokowaniu przechodzenia niedojrzałych pcheł do środowiska kota, przez 3 miesiące.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u kotów i kociąt ważących mniej niż 0,6 kg. Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach obserwowane można niewielkie łuszczenie skóry, przemijający rumień i wyłysienia, które zazwyczaj ustępują samoistnie bez konieczności leczenia. Bardzo rzadko mogą wystąpić, zwłaszcza po wylizaniu miejsca podania, przemijające objawy neurologiczne, takie jak drżenie mięśni lub letarg. Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu podania wystąpić mogą przemijające zmiany kosmetyczne, takie jak mokry wygląd sierści i biały suchy nalot, utrzymujące się do 7 dni; jednakże zazwyczaj znikają one w ciągu 48 godzinach. Zmiany te nie mają wpływu na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego. Bardzo rzadko mogą występować inne zaburzenia w miejscu podania, takie jak rumień, świąd, zmiany patologiczne i stan zapalny. Bardzo rzadko wystąpić może nadaktywność i przyspieszenie częstości oddechów.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działania(a) niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze przypadki).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulocie informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Sposób i droga podania: Przez nakrapianie. Należy zwrócić uwagę, aby stosować produkt leczniczy weterynaryjny tylko na nieszkodzoną skórę kota. **Dawkowanie:** Jeden aplikator do nakrapiania należy użyć na jedno podanie dla jednego kota. Nie zaleca się stosowania u kotów poniżej 7 tygodnia życia lub ważących mniej niż 0,6 kg. (Minimalna zalecana dawka to 42,3 mg dinotefuranu/kg masy ciała i 4,23 mg pyriproksyfenu/kg masy ciała. Zakres dawek wynosi od 42,3 do 705 mg dinotefuranu/kg masy ciała oraz od 4,23 do 70,5 mg pyriproksyfenu/kg masy ciała dla kotów o masie ciała od 0,6 do 10 kg).

Schemat leczenia: Po jednokrotnym podaniu produkt leczniczy weterynaryjny zabezpiecza przed inwazją pcheł przez jeden miesiąc, produkt zapobiega także dalszemu namnażaniu pcheł, blokując ich przechodzenie do środowiska kota, przez 3 miesiące. Konieczność ponownego zastosowania produktu u kotów narażonych na re-inwazję oraz czas pomiędzy kolejnymi podaniami ocenia i ustala lekarz weterynarii.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Sposób podania: Wyjąć aplikator do nakrapiania z opakowania.

Krok 1:

Umieścić palce pod większym dyskiem i trzymać aplikator pionowo, jak pokazano na rysunku.



Krok 2:

Drugą ręką wcisnąć mniejszy dysk do dołu, tak by oba dyski równo się stykały. Przebijcie to uszczelnienie.



Krok 3:

W celu ułatwienia podania, kot powinien stać lub przysiąc wygodną pozycję. Rozdzielić sierść u podstawy głowy kota tak, by była widoczna skóra. Powoli podawać produkt leczniczy weterynaryjny, trzymając końcówkę aplikatora na skórze. Unikać powierzchniowego podania na sierść kota.



SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na pudełku i aplikatorze do nakrapiania po upływie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Wszystkie koty w danym domu powinny być leczone. Psom należy podać wyłącznie produkt leczniczy weterynaryjny dopuszczony do stosowania u tego gatunku zwierząt. Pchły mogą bytować w koszu kota, legowisku oraz miejscach częstego odpoczynku tj. dywany i meble tapicerowane. W przypadku masowej inwazji pcheł oraz na początku wprowadzenia środków kontroli, miejsca te powinny być traktowane odpowiednim insektycydem, a następnie regularnie odkurzone. Wpływ mycia szamponem na skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego nie został zbadany. W przypadku podejrzenia zapalenia skóry (świąd i podrażnienie skóry), należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Tylko do użytku zewnętrznego. Nakładaj tylko na powierzchnię skóry. Nie podawaj doustnie ani żadną inną drogą. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie było badane u kotów w wieku poniżej 7 tygodnia życia, ani ważących mniej niż 0,6 kg (patrz punkt "Przeciwwskazania"). W przypadkowym połknięciu produktu mogą wystąpić przemijające reakcje, takie jak ślinienie, nieprawidłowy kał i wymioty. Powinny one jednak ustąpić w ciągu 4 godzin bez konieczności leczenia. Należy zachować ostrożność, by podać także dawki w miejsce, z którego zwierzę nie będzie w stanie go zlizać (jak opisano w punkcie "Zalecenia dla prawidłowego podania"). Należy także unieważnić wzajemnie wylizywanie się przez koby bezpośrednio po podaniu produktu. Należy zachować ostrożność w celu zapewnienia, by zawartość aplikatora do nakrapiania ani podana dawka nie dostały się do oczu leczonego kota ani/lub innego zwierzęcia. Ze względu na brak badań przeprowadzonych u kotów chorych i rekonwalescentów, stosowanie produktu u tych zwierząt powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści/ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dotyczące podania produktu leczniczego weterynaryjnego zwierzętom: Osoby o znanej nadwrażliwości na dinotefuran, pyriproksyfen czy dimetylosulfonole powinny uniknąć kontaktu z produktem leczniczym. Nie należy stosować produktu leczniczego weterynaryjnego w celu drażnienia na oczy i skórę. W celu uniknięcia działań niepożądanych:

- Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami.
- Po przypadkowym rozlaniu na skórę należy natychmiast zmyć wodą z mydłem.
- Po przypadkowym dostaniu się produktu leczniczego weterynaryjnego do oczu należy je natychmiast płukać przemywając powieki oraz przez odpowiednio długi czas.
- Nie należy dotykać leczonych kotów przez co najmniej osiem godzin po podaniu produktu leczniczego weterynaryjnego. Z tego względu zaleca się podanie produktu wieczorem.
- W dniu podania produktu koty nie powinny spać w łóżku z właścicielami, zwłaszcza z dziećmi.
- Zużyty aplikator należy natychmiast wyrzucić. Nie wolno zostawić go w miejscu widocznym i dostępnym dla dzieci.

W przypadku utrzymania się objawów podrażnienia skóry, zdrowym kocicóm w wieku 7 tygodni i starszym, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii. W przypadku podejrzenia inwazji pcheł, zdrowym kocicóm w wieku 7 tygodni i starszym, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii. W przypadku podejrzenia inwazji pcheł, zdrowym kocicóm w wieku 7 tygodni i starszym, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii. W przypadku podejrzenia inwazji pcheł, zdrowym kocicóm w wieku 7 tygodni i starszym, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony.

Ważność opakowania: Nie należy wyrzucać do kanalizacji; ani domowych pojemników na odpady. Należy użyć do celów innych niż do celów, do których jest przeznaczony. Nie należy używać do celów innych niż do celów,

NOT VECTRA FELIS 3PK GB IT PL GR 680x160/FP26.5x160 Recto Verso CODE ARTICLE : 56711-07 Black	VECTRA FELIS 3PK GB IT PL GR ID78397 CORPS : 8 Pts
---	--

MYRIAM 09/01/23
